

پمفيگوس کودکان: گزارش دو مورد

دکتر رضا یعقوبی^۱، دکتر محمد امیدیان^۱، دکتر نیلوفر سینا^۲

۱- دانشیار، ۲- دستیار؛ گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بالینی و هیستوپاتولوژی بوده است. یک بیمار را فقط با کورتیکواستروئید خوراکی و دیگری را علاوه بر استروئید سیستمیک با داپسون، جهت کاستن عارضه استروئید، درمان نمودیم. پیگیری طولانی مدت بیماران جهت شناخت شعله ور شدن ناگهانی بیماری و عوارض داروهای اینتیساپرسيو ضروری است.

واژه‌های کلیدی: پمفيگوس، کودکان، خوزستان

بیماری پمفيگوس در کودکان نادر است و در بررسی مقالات تا کنون فقط ۷۱ مورد گزارش شده است. ما دو مورد پمفيگوس ولگاریس (سنین ۱۵ و ۱۳ سالگی) را از خوزستان و از بین ۱۴۷ بیمار مبتلا به پمفيگوس که در یک فاصله زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹ به مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کردند، گزارش می‌کیم. مبنای تشخیص هر یک از دو بیمار، یافته‌های

مؤنث ^۱ می‌باشد در حالی که فقط ۱۰ مورد از پمفيگوس کودکان، کمتر از ۱۰ سال داشتند ولی اکثریت موارد بین ۱۱-۱۵ سالگی بودند که یافته اخیر افزایش ناگهانی بروز بیماری را در دوران بلوغ، پیشنهاد می‌کند^(۱). کودکان معمولاً دچار ضایعات دهانی مداوم هستند ولی پوست ممکن در گیر باشد و یا نباشد^(۲).

ما دو مورد پمفيگوس ولگاریس کودکان را از خوزستان گزارش می‌کیم. تشخیص بیماران بر اساس یافته‌های بالینی و هیستوپاتولوژی استوار بوده و علاوه بر تجویز کورتیکواستروئید سیستمیک در درمان آنها، از داپسون به عنوان یک داروی کمکی در یک مورد، جهت کاستن عوارض استروئید استفاده کردیم.

گزارش بیماران

بیمار اول: دختری ۱۳ ساله با وزیکولها و تاولهای راجعه بر روی قسمت فوقانی سینه به مدت ۶ ماه از شهرستانهندیجان مراجعه کرد. او دو ماه بعد از پیدایش ضایعات سینه،

مقدمه

پمفيگوس یک بیماری اتوایمیون است که باعث ابتلاء پوست و مخاط می‌شود. پمفيگوس ولگاریس یک واریانت از پمفيگوس و یک بیماری وزیکولوبولوز است که در آن اتصال کراتینویت‌ها از یکدیگر گستره و منجر به ایجاد تاول داخل اپiderم می‌شود^(۱). این بیماری معمولاً در حین و یا بعد از میانسالی دیده می‌شود. میانگین سن شروع بیماری دهه ششم و یا در سنین ۴۰-۶۰ سالگی گزارش شده است. بیماری پمفيگوس کودکان نادر و تاکنون ۷۱ مورد در جهان گزارش شده است که از این تعداد ۵۰ مورد پمفيگوس ولگاریس، ۲۰ مورد پمفيگوس فولیاسه و یک مورد پمفيگوس وزتانت بوده است^(۲).

میانگین سن شروع فعالیت بالینی پمفيگوس کودکان ۱۲ سالگی است. میانگین سن ابتلاء پسران و دختران به ترتیب ۱۱ و ۱۲ سالگی است. نسبت ابتلاء جنس مذکور به

مؤلف مسئول: دکتر رضا یعقوبی - بخش پوست، بیمارستان سینا، اهواز.

نتیجه کشت از ترشحات زخم استافیلوکوک اورنوس کواگولاز مثبت بود. نتایج کشت‌های خون منفی و سایر آزمایشات در حد نرمال بود. پس از تزریق چندین نوع آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف تب یمار قطع شد.

درمان با پردنیزولون خوراکی و دوز ۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن (روزانه ۵۰ میلی گرم) شروع شد ولی بهبودی مشاهده نشد و همچنان ضایعات وزیکولی و تاولی ظاهر می‌شد. دوز پردنیزولون به ۶۰ میلی گرم روزانه افزایش داده شد. پس از یک ماه از شروع درمان تشکیل تاول جدید قطع شد. یمار قیافه شبیه به کوشینگ و آکنه استرتوئیدال خفیف پیدا کرد. جهت کاستن عوارض استرتوئید، با شروع کاهش تدریجی دوز پردنیزولون، ۵۰ میلی گرم روزانه داپسون به رژیم دارویی یمار افزوده شد. یمار در حال حاضر فاقد ضایعه تاولی و تحت پیگیری است.

بحث

یماریهای ایمیونوبولوز در کودکان شایع نیست، به طوری که Weston و همکارانش از ژاپن طی پیش از ۱۶ سال فقط ۲۴ مورد را در یک جمعیت ۴ میلیونی مراجعه کننده گزارش کردند (۴). تجربه ما در اهواز (خوزستان) مشابه سایرین می‌باشد و طی پیش از یک دهه و از بین ۱۴۷ مورد پمفیگوس فقط دو مورد پمفیگوس کودکان (۱/۳٪) تشخیص داده و سپس درمان شدند.

به نظر می‌رسد علیرغم نادر بودن پمفیگوس در کودکان، اشکال بالینی، سیر و درمان آن مشابه پمفیگوس بالغین می‌باشد (۵). در این گزارش، تظاهرات بالینی و نقاط ابتلا دو مورد پمفیگوس کودکان مشابه آنچه در پمفیگوس بالغین وجود دارد دیده شد.

کورتیکواستروئیدها درمان خط اول پمفیگوس کودکان هستند (۲، ۵). یمار اول فقط با پردنیزولون خوراکی کنترل شد و اکنون پس از گذشت ۷ ماه با حداقل دوز نگهدارنده،

دچار تاول‌هایی پراکنده در نواحی گردن، شکم، اندام‌ها، پوست سر و نیز زخم‌های دردناک بر روی مخاط لب‌ها و دهان شد.

در معاینه تاولهای شل، همراه با اروزیونهای دلمه دار، مترشحه و منتشر بر روی تن، اندامها و پوست سر دیده شد. نشانه نیکولسکی مثبت بود. اروزیون و زخم بر روی مخاط لب‌ها و دهان دیده شد. سایر یافته‌های معاینه غیرقابل ملاحظه و طبیعی بودند. نتایج تست‌های آزمایشگاهی در حد طبیعی بودند. بیوپسی پوست، تشکیل تاول بالای لایه بازال همراه با چندین سلول آکانتولیتیک و تعداد کمی انوزینوفیل را نشان داد. در درم ارتشاخ خفیف سلولهای انوزینوفیلیک و لنفوسيت مشاهده شد. درمان با پردنیزولون خوراکی و با دوز ۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن (۴۰ میلی گرم روزانه) شروع شد. بعد از دو هفته از آغاز درمان یماری کنترل شد، به طوری که ضایعات قدیمی بهبودی یافته و ضایعات جدید مشاهده نشد. تدریجاً دوز پردنیزولون کاسته شد و بعد از حدود ۷ ماه پیگیری یمار با حداقل دوز نگهدارنده (۱۰ میلی گرم روزانه) تحت درمان می‌باشد.

یمار دوم: پسری ۱۵ ساله با تاولها و زخم‌های سطحی وسیع نواحی صورت، تن، اندامها، پوست سر و دهان به مدت ۱ ماه از شهرستان مسجد سلیمان مراجعه کرد. او حدود یک هفته بعد از ضایعات پوستی دچار ضایعات اروزیو وسیع و دردناک لب‌ها و مخاط دهان شد.

در معاینه وزیکول‌ها و تاول‌های شل همراه با مناطق پوست رفته در تن، اندامها، صورت و پوست سر دیده شد. بر روی لب‌ها و دهان نیز اروزیون‌های شدید و وسیع دیده شد و پیش از ۷۰٪ سطح بدن در گیر بود. نشانه نیکولسکی مثبت بود. بیوپسی پوست، تشکیل تاول بالای لایه بازال و انباسته از سلولهای آکانتولیتیک و گلبولهای قرمز را نشان داد. در درم ارتشاخ خفیف لنفوسيت‌ها مشاهده شد. یمار در طی مدت بستری دچار تب‌های ممتد و مکرر می‌شد.

دایسون از سایر داروهای کمکی بی خطرتر می باشد ولی نتیجه و اثر درمانی آن در کودکان وبالغین به طور رضایت‌بخشی ارزیابی نشده است(۲). اگرچه دایسون از کورتیکواستروئید سیستمیک کم عارضه‌تر می باشد ولی دارای چندین عارضه جانبی است که بررسی پیوسته بیماران تحت درمان با آن واجب است(۶). آنتی مالاریاها دارای خواص ضدالتهابی قوی و تنظیم کننده سیستم ایمنی است. از این دارو به طور موفقیت آمیزی در درمان پمفیگوس فولیاسه تشدید یافته با اشعه ماوراء بخش استفاده شده است. تجویز داروهای ایمیونوساپرسیو و یا طلا زمانی که استفاده از کورتیکواستروئیدهای سیستمیک با مشکلات واقعی و یا بالقوه‌ای همراه باشد، توصیه می شود. طلا اثر سرطان زایی و یا نازایی نداشته ولی حدود ۲۵٪ کودکان مبتلا به آرتربیت روماتوئید نوجوانان که با طلا درمان شدند، واکنش سمی نشان دادند. جدی‌ترین عوارض شایع طلا شامل سمیت کلیوی، اختلالات خونی و واکنش‌های آلرژیک پوستی است. آزاتیوپرین بیشترین داروی مهارکننده ایمنی است که به عنوان داروی کمکی، برای درمان با استروئید به کار می رود. به نظر می رسد امروزه متورکسیت به سبب ایجاد عفونت و اختلال در ترمیم زخمها پوستی ندرتاً در درمان پمفیگوس استفاده می شود. درمان با سیکلوفسفامید سمی تر از آزاتیوپرین است و شناس بیشتری جهت ایجاد سیستیت همورازیک، نازایی، سرطان مثانه و سایر بدخیمی‌ها را دارا می باشد. عوارض سمی سیکلوفسفامید روی گونادها به شکل آمنوره، آزو سپرمه و نازایی می باشد. این اثرات وابسته به دوز بوده و می تواند غیرقابل برگشت باشد. درمان با آزاتیوپرین می تواند منجر به Alijotas مشکلات مشابه شود ولی کمتر شایع می باشد(۲).

و همکارانش نتایج درمان موفقیت آمیز بمفیگوس فامیلی کودکان را در یک خواهر و برادر فقط با سیکلوفسپورین و بدون عارضه جانبی بارز گزارش کردند. آنها معتقدند از

بدون ضایعه پوستی و مخاطی است. در یک مطالعه جامع گزارش شده است که فقط ۲۱ مورد پمفیگوس کودکان با کورتیکواستروئید خوراکی تنها و به عنوان درمان سیستمیک مهار کننده ایمنی درمان شدند که تمامی آنها به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند(۱).

در کودکان، درمان طولانی مدت با کورتیکواستروئیدهای سیستمیک پر خطر می باشد. عارضه جانبی شایع و اغلب ناگزیر که مسلمان مختص به کودکان هم نیست، مهار محور آدرنال-هیپوفیز-هیپوتالاموس و اثرات همراه می باشد که می تواند موجب مشکلات عمدۀ نیز شود(۶). سندروم کوشینگ، عفونت، تأخیر رشد، همراه تأخیر ظهور بلوغ و تکامل رشد سیستم اسکلتی شایع ترین عوارض جانبی کورتیکواستروئیدها در کودکان هستند(۶ و ۱). در صورت امکان کورتیکواستروئیدهای سیستمیک می باشد درمان اصلی و اساسی پمفیگوس باشند، اگرچه راهنمای اطلاعاتی محکمی درخصوص تجویز دوز مطلوب و میزان آن به هنگام تجویز داروی کمکی وجود ندارد، پیشنهاد شده است که دوز شروع کورتیکواستروئید می باشد ۲-۳ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم روزانه و به مدت دوهفته باشد و سپس با کاستن تدریجی دوز استروئید به ۰/۵-۰/۸ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم روزانه برسد. بر حسب فعل بودن بیماری می توان رژیم یک روز در میان را جهت کاهش بیشتر دوز دارو اعمال کرد(۱).

در بیمار دوم، به قصد کم کردن دوز استروئید، دایسون به رژیم دارویی او اضافه شد. به جهت تشخیص به موقع احتمال عود و شدت یافتن بیماری و هم به سبب احتمال بروز عوارض دارویی، به بیمار برای پیگیری طولانی مدت، تأکید بسیار شد. داروهای کمکی در درمان پمفیگوس کودکان شامل ایمیونوساپرسیوها، طلا، آنتی مالاریا، دایسون(۲)، پلاسمافرژیس و پالس‌های کورتیکواستروئید می باشد(۱).

تهاجمی در نتیجه نهایی بیماری تأثیر دارد، مشخص نیست. ضروری است که پزشکان از وجود پمفیگوس ولگاریس دوران کودکی به جهت تشخیص سریع و اجتناب از تأخیر درمان مطلع باشند. همچنین باگزارشات همکاران متخصص در خصوص پمفیگوس کودکان می‌توان به اطلاعات بهتر و بیشتری در خصوص همه گیرشناسی، درمان مطلوب و نتایج پیگیری بیماران دست یافت. اگر چه هنوز توصیه‌های استانداردی در خصوص درمان حتی پمفیگوس بالغین که شایع‌تر است وجود ندارد، ولی تجویز کورتیکواستروئید سیستمیک به عنوان داروی انتخابی، علیرغم داشتن عوارض جانبی، به طور بارزی پیش‌آگهی بیماری را بهتر می‌کند. خطرات و اثرات سودمند تمامی داروهای مصرفی در درمان پمفیگوس کودکان را می‌بایست در نظر داشت و پیگیری طولانی مدت آنها نیز لازم است.

آنچاییکه درمان با داروهای مهارکننده اینمنی متداول در بچه‌ها با خطرات بزرگی همراه است، لذا درمان با سیکلوسپورین مورد پیدامیکنند. عوارض جانبی سیکلوسپورین در بیماران مبتلا به بیماری اتوایمیون کمتر از دریافت کنندگان پیوند می‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد که بچه‌ها کمتر مستعد عوارض جانبی درمان با سیکلوسپورین هستند(۷).

پیش آگهی پمفیگوس در کودکان به مقیاس قابل ملاحظه‌ای متغیر می‌باشد. قبل از دسترسی به کورتیکواستروئیدها نزدیک به ۷۵٪ بیماران معمولاً اطی بیکسال می‌مردند. استفاده از کورتیکواستروئیدها میزان مرگ و میر را به طور متوسط به ۳۰٪ تقلیل داده است(۲). از آنجاییکه سرنوشت اکثر موارد گزارش شده معلوم نیست لذا پیش بینی پیش آگهی طولانی مدت پمفیگوس ولگاریس کودکان غیرممکن می‌باشد. فقط یک مورد مرگ گزارش شده است(۱) و اینکه آیا درمان سریع و

منابع

- 1- Bjarnason B, Flosadottir E. Childhood, neonatal, and stillborn pemphigus vulgaris. *Int J Dermatol* 1999; 38: 680-88.
- 2- Wanankul S, Pongprasit P. Childhood pemphigus. *Int J Dermatol* 1999;38:29-35.
- 3- Halmet KR, Stevens SR, Gushurst C, et al. Juvenile pemphigus vulgaris associated with graves' disease. *J Am Acad Dermatol* 1995; 33: 132-33.
- 4- Weston WL, Friednash M, Hashimoto T, et al. A novel childhood pemphigus vegetans variant of intraepidermal neutrophilic IgA dermatosis. *J Am Acad Dermatol* 1998; 38: 635-38.
- 5- Antaya RJ, Prieto VG, Prose NS. Mucosal erosions and bullae in a child. *Arch Dermatol* 2000; 136:665-70.
- 6- Qureshi WA, Ali A, Bhol KC, Ahmed AR. Juvenile pemphigus foliaceous treated with sublesional corticosteroids. *Int J Dermatol* 1997; 36: 848-58.
- 7- Alijotas J, Pedragosa R, Bosch J, Vilardell M. Prolonged remission of cyclosporine therapy in pemphigus vulgaris. Report of two siblings. *J Am Acad Dermatol* 1990; 23: 701-703.